

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

第2類医薬品

生薬製剤



痛効散はマオウ(麻黄)、キョウニン(杏仁)、ヨクイニン(薏苡仁)、カンゾウ(甘草)の4種の植物生薬をのみやすいエキス顆粒とした製剤です。

痛効散は次のような症状を目標に使用すると、筋肉の緊張を和らげ、体表に停滞している水分の代謝を改善することによって、関節痛、神経痛、筋肉痛にすぐれた効きめをあらわします。

- ◇関節に水がたまり、腫れて痛む…
- ◇四肢が重だるく痛い…
- ◇冷えたり、風に当たったりすると痛みが増す…
- ◇夕方や明け方になると痛みが増す…
- ◇筋肉が腫れたり、緊張があって痛む…

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる〕

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
  - (4) 胃腸の弱い人
  - (5) 発汗傾向の著しい人
  - (6) 高齢者
  - (7) 次の症状のある人
    - むくみ、排尿困難
  - (8) 次の診断を受けた人
    - 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状               |
|------|-------------------|
| 消化器  | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

| 症状の名称           | 症 状   |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## 効能

体力中等度なものの次の諸症：関節痛、神経痛、筋肉痛、いぼ、手足のあれ(手足の湿疹・皮膚炎)

## 用法・用量

食前または食間に水またはお湯で服用すること

| 年齢        | 1回量  | 服用回数 |
|-----------|------|------|
| 大人(15才以上) | 1包   | 1日3回 |
| 7~14才     | 2/3包 |      |
| 4~6才      | 1/2包 |      |
| 2~3才      | 1/3包 |      |
| 2才未満      | 1/4包 |      |

食間とは…食後2~3時間を指します。

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- (2)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること

## 成分

痛効散は、灰かっ色の顆粒で、3包(1包2g)中、下記植物生薬の抽出乾燥エキス2,020mgを含有します。

〔マオウ……………4.0g ヨクイニン……………10.0g〕  
〔キョウニン……………3.0g カンゾウ……………2.0g〕

添加物として乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルスターチを含有します。

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

救心製薬株式会社 お客様相談室

電話:03-6861-9494

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日、弊社休業日を除く)

® 登録商標

 救心製薬株式会社  
東京都杉並区和田1-21-7